Deux Carabiques nouveaux de l'Uruguay

par

JUAN TREMOLERAS

A continuation je donne la description de deux espèces de carabiques appartenant à deux genres différents, dont l'un *(Obadius)* n'avait été signalé que dans l'Argentine et l'autre *(Lachnophorus)* ni dans ce pays ni dans l'Uruguay.

Obadius affinis n. sp.

O. insigni Burm. *simillimus, attamen major. Corpus subtus haud impunctatum, sed prosterni episternis sparsim subtilissime, segmentis abdominis ante lateribus marginem sat dense profundeque punctatis.*

Long. 14 mm.; lat. 3.5 mm.

Cette espèce est très voisine de l'*Obadius insignis* Burm. (Trans. ent. Soc. Lond. 1875, p. 341) mais elle en diffère par sa taille plus grande; en outre, dans la nôtre on voit sur les épisternes prosternaux quelques points épars, très petits, et les segments abdominaux portent près du bord extérieur quelques points assez gros et assez enfoncés, situés contre le sillon transversal de chaque segment. Ces sillons sont fortement marqués, surtout vers les côtés. Par contre, l'O. *insignis* a les "pectora et abdomen... impuctata" d'après l'auteur dans la description du genre, et il le répet dans celle de l'espèce en disant: "corpus subtus impunctatum". Je ne trouve d'autres différences appréciables avec l'O. *insignis* (au moins d'après la description de l'auteur) que celles que je viens d'énoncer.

Hab.: Uruguay: Cerro Largo (Cañada de los Burros), 2 exempl. dont l' un l'holotype; Treinta y Tres, 2 exempl. Ma collection.

Lachnophorus Montoroi n. sp.

Nigro-aeneus, pubescens; thoracis angulis anticis obtusis, posticis rectis, lateribus ante medium dilatatis; elytris subparallelis, testaceo-albicantibus, maculis quatuor albidis; antennis pedibusque tetaceis.

Long. 4-4,5 mm.; lat. 1,5-1,7 mm.

Tête triangulaire, noir avec un reflet bronzé-doré clair, ponctuée entre les yeux, rugueuse entre les antennes. Mandibules noires; palpes brun noirâtres. Antennes testacées.

Pronotum un peu plus étroit que la tête y compris les yeux, avec le bord antérieur coupé presque carrement, tronqué à la base; angles antérieurs obtus; côtés dilatés avant le milieu, retrécis postérieurement, formant un angle droit avec la base; la surface est rugueuse, de la même couleur de la tête et, comme celle-ci, couverte de poils jaunâtres assez

longs et peu serrés; la ligne longitudinale du milieu est bien visible, le sillon submarginal antérieur est peu distinct, mais le postérieur est fortement marqué.

Ecusson triangulaire, allongé, noir.

Elytres légèrement ovales, presque parallèles, avec les angles antérieurs plus brièvement arrondis que les postérieurs; côtés très faiblement dilatés dès un peu avant le milieu; stries bien marquées et plus profondement ponctuées dans leur tiers basal; coloration testacée blanchâtre avec une bande irrégulière plus obscure qui occupe presque les deux tiers antérieurs, s'avançant un peu plus vers l'extrémité sur les trois premiers intervalles. En outre, on voit sur chaque élytre deux tâches blanchâtres disposées de la manière suivante: la prémière humérale descend jusqu'au premier tiers de l'élytre où, formant presque une lunule, elle occupe les sixième et septième intervalles; la seconde, située à peu près aux trois quarts de l'élytre, forme une bande irregulière occupant le premier intervalle avant l'extrémité, les deuxième et troisième plus en haut, les quatriéme, cinquième et sixiéme encore plus en haut, descendant sur les septième et huitième et dépassant en hauteur ceux-ci sur le neuvième. Le bord extérieur et l'extrémité, qui sont plus clairs que le reste des élytres, se confondent presque avec la couleur de ces tâches. Au premier tiers de chaque élytre, sur le troisième intervalle, on voit un gros point enfoncé qui est une vraie fovéole; sur la deuxième strie il y a deux points: l'un au milieu, l'autre plus petit au-delà du milieu. Toute la surface des élytres est couverte de poils blancs assez longs et peu serrés, parsemée de quelques poils noirs plus longs.

Dessous du corps noir avec un lèger reflet bronzé, à l'exception des deux derniers segments ventraux qui sont testacés.

Pattes testacées, garnies de poils, avec les deux tiers basals des cuisses, la moitié apicale des jambes et l'extrémité des articles tarsaux rembrunis.

Hab. Uruguay: Flores (Costa del Yi, Estancia "La Criolla"), 20, I, 1929; Florida (Yi y Timote), 15, I. 1930. — Plusieurs exemplaires dans ma collection, parmi lesquels l'holotype provenant de la première des localités citées.

Cette espèce est voisine du *L. pallidipennis* Putz. (Mém. Soc. R. Sc. Liège, II, 1845, p. 409), mais elle en diffère par la forme du pronotum, par la disposition des tâches sur les élytres, par la coloration des antennes et des pattes, etc. Elle a été recueillie par mon ami M. l'Ing. Arturo Montoro Guarch, professeur de botanique à la Faculté d'Agronomie de Montevideo, auquel je suis redevable de beaucoup d'insectes de l'Uruguay fort intéressants dont il a bien voulu enrichir ma collection.